



## دراسة بعض المتغيرات الفسلجية والوراثية والجزئية لدى عينة من متعاطي الحبوب المسهرة(الكابتاكون) في مدينة الرمادي

سمير مشرف خلف

جامعة الانبار – كلية التربية للبنات

### الخلاصة:

أجريت الدراسة على (80) شخصاً معتاداً على تعاطي الحبوب المسهرة (الكابتاكون)، تراوحت أعمارهم بين 20- 40 سنة وفترة اعتياد تراوحت بين 2- 5 سنة وبمجموعتين (40) سائق و(40) حارس ليلى بالإضافة إلى (20) شخص لا يتعاطى أي أدوية كعينة مقارنة، كان الهدف من الدراسة تشخيص الأعراض الجانبية التي قد ترافق حالة التعاطي وتعيين التغيرات الفسلجية التي قد تحدث للمتعاطين، بالإضافة إلى دراسة التغيرات الوراثية الخلوية والجزئية لديهم. تشير الدراسة إلى حدوث جملة من الأعراض (الانسحابية خصوصاً) كالتعب والإكتئاب، بالإضافة إلى حدوث انخفاض معنوي  $P < 0.05$  في تركيز Hb% على التوالي، يرافقه انخفاض معنوي  $P < 0.05$  في معدل تعداد كريات الدم البيض لعينتي التعاطي إذ بلغ (4100 و4600) خلية/ملم 3 مقاروناً بانخفاض المناعة الواضح، كما لوحظ ارتفاع معنوي  $P < 0.05$  في معدل ترسيب كريات الدم الحمر (ESR) (51 و45) Erythrocyte sedimentation ratio على التوالي، من جانب آخر لوحظ ارتفاعاً معنواً  $P < 0.05$  في فحوصات وظائف الكبد Liver function tests (TSB) Total serum belirubine 3.2 (mg/dl) وبلغ معدل بليروبين مصل الدم الكلي (K.A.U/dl) (27 و24) وبلغ إنزيم الفوسفاتيز القاعدي (ALP) (24 و27) mg/dl. وبلغ معدل الإنزيمات الاوكسيلية الناقلة للأمينات (GOT) (38 و32) U/L، كما لوحظ ارتفاعاً معنواً  $P < 0.05$  في فحوصات البايروفيتية الناقلة للأمينات (GPT) (38 و36) U/L، كما لوحظ ارتفاعاً معنواً  $P < 0.05$  في فحوصات وظائف الكلية، إذ بلغ تركيز يوريا الدم (Blood Urea) (47 و42) mg/dl في حين كان كرياتينين مصل الدم Serum creatinine لدىهم (1.8 و1.4) mg/dl. على الرغم من عدم الكشف عن أي حالة تكسر أو ضرر كروموسومي إلا أن تكون النوى الصغيرة Micronuclei بنسبة (13 و9)% في عينتي الدراسة تشير إلى إمكانية حدوثكسور أو ضرر دقيق لم يتم ملاحظته في فحص الهيئة الكروموسومية، كما لوحظ ارتفاع معامل الانقسام (MI) في عينتي الدراسة (2.7 و3.0) وتكون حزم جديدة في فحص (RAPD-PCR) بنسبة (7 و3)% في عينتي الدراسة..

E-mail address:

المقدمة

بيولوجية، دوائية واجتماعية، ويمكن تقسيم المخدرات أو تصنيفها إلى المخدرات الطبيعية (الحشيش والأفيون والقات والكوكا) والمخدرات المصنعة (المورفين والهيرودين والكوداين والسيدول والديوكامفين والكوكايين) والمخدرات التخليقية (عقاقير الهلوسة والعقاقير المنشطة والمنبهات والعقاقير المهدئة). [2,1]

يعرف الإدمان (Addiction) على أنه اضطراب سلوكي يظهر تكرار فعل معين من قبل الفرد بعض النظر عن العواقب الضارة بصحة الفرد أو حالته العقلية أو حياته الاجتماعية، وهناك العديد من العوامل التي تم اقتراحها كأسباب للإدمان تشمل عوامل وراثية،

\* Corresponding author at: University of Anbar - College of Education for women;  
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5859-6212>.Mobil:777777

مرور الوقت وتكرار الجرعة يتحمل الجسم تأثيرها ونقل فاعليتها [2,5,6].

وبالنظر لأهمية هذا الموضوع وعدم توفر دراسة تعطي جوانبه التي تهم المجتمع جاءت هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف وهي:

- تسليط الضوء على ظاهرة إيمان هذه الحبوب والكشف عن مضارها الصحية والنفسية.

- دراسة التأثيرات الفسلجية الناتجة عن تعاطي هذه الحبوب.

- دراسة التأثيرات الوراثية التي قد تطرأ على المتعاطين.

### المواد وطرق العمل

جمع عينات الدم

بعد إجراء الاستبيان المباشر لفترة التعاطي ونوع الحبوب المستخدمة تم جمع عينات الدم من (80) شخص يتعاطون الحبوب المسهرة (40) سائق و (40) حارس ليلى للفترة من 07/1/2010 ولغاية 26/3/2011 جميعهم من الذكور بعمر متوسط (30) سنة، كما تم جمع (20) عينة أخرى لفترات تتراوح بين (2-5) سنة، كما تم جمع (10) عينة أخرى (10) سائق و (10) حارس ليلى لا يتعاطون أي علاج كعينة سيطرة، وتم إجراء جميع الفحوصات في مختبرات كلية التربية للبنات جامعة الانبار ومستشفى النساء والأطفال - الرمادي.

### دراسة المتغيرات الدموية

Hemoglobin 1- قياس كمية الهيموغلوبين (Hb) concentration اس تخدمت طريقة (Cyanmethaemoglobin) لحساب تركيز الهيموغلوبين في الدم [7].

E.S.R measurement 2- قياس معدل ترسيب كريات الدم الحمر Erythrocyte sedimentation ratio استخدمت طريقة وستركرين (Westergreen method) لتقدير معدل ترسيب كريات الدم الحمر [7].

Estimation of the leukocyte Neubauer counting 3- تعداد كريات الدم البيض number استخدمت طريقة عدد chamber لتحديد عدد كريات الدم البيض [7].

4- قياس البيليروبين الكلي في المصل (Total serum bilirubin) استخدمت الأنابيب الشعرية (Capillary tubes) وجهاز الطرد المركزي (Haematocrite fuge) والمطياف الضوئي spectrophotometer على طول موجي 450 نانومتر لقياس كمية بيليروبين المصل الكلي [8].

تعتبر المواد المخدرة التخليقية من أكثر المواد الكيميائية خطورة على جسم الإنسان، حيث يطال تأثيرها المدمر كافة أجهزة الجسم وخاصة الأعضاء الداخلية الأكثر حيوية، وقد تكون بعض الأعراض الآتية واضحة لكل من يتناول هذه المواد القاتلة، لكن تأثير هذه المواد يمتد ليطال كافة الأعضاء الداخلية في الجسم، وهناك مجموعة من المواد الاصطناعية سواء من العقاقير أو غيرها مصنعة من مواد أولية طبيعية، ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك، كما أنها قد تترك لدى المتعاطي اعتماداً وإيماناً نفسي أو عضوي أو كلاهما وأهمها العقاقير المنشطة، المنبهات (Psychotoniques) كالكاباتكون (Fenethylline) وهي مواد ترفع القدرة الجسمانية والذهنية لمن يتعاطاها بصفات طبية محددة وقد استخدمت هذه العقاقير طبياً في علاج بعض الأمراض والحالات أهمها تقليل شهية المصابين بالسمنة البالغة، علاج الشلل الرعاش (مرض باركنسون)، علاج بعض حالات الاكتئاب النفسي، علاج إدمان الخمور، غير أن هذه العقاقير وجدت طريقها إلى مدمني المخدرات، إذ تعد مشكلة تعاطي الحبوب المسهرة (الكاباتكون Captagon) من المشاكل الصحية والاجتماعية الخطيرة التي باتت تهدد مجتمعاتنا بغياب المحاسبة والوازع الديني، إذ يتعاطى سائقوا الشاحنات وسيارات الأجرة الذين يقطعون مسافات طويلة والأشخاص الذين يعملون في ساعات متأخرة من الليل (الحرس الليلي) جرع مختلفة من هذه الحبوب لغرض التيقظ وزيادة الطاقة والنشاط وتقليل الجوع [1,3]، إن الحبوب المسهرة أو (حبوب 0-1) أو الكاباتكون هي الأسماء التجارية للفينثيلين (Fenethylline) وهو مركب شبيه للأمفيتامين (amphetamine) والصيغة الكيميائية لها هي (C<sub>18</sub>H<sub>23</sub>N<sub>5</sub>O<sub>2</sub>) وهي مواد منشطة تسبب النشاط الزائد وكثرة الحركة وعدم الشعور بالتعب والجوع وتسبب الأرق، وتعتبر من المخدرات التصنيعية المحظورة، ويتم تصنيع الكاباتكون في دول شرق أوروبا مثل بولندا وبولندا وبلغاريا وتصدر إلى تركيا ومنها إلى سوريا حيث تهرب من سوريا إلى السعودية ودول الخليج عبر الأردن والعراق. وفي الآونة الأخيرة أصبحت تصنع في الدول العربية [2,4]، واعتبر الكاباتكون ذو آثار جانبية أكثر من المنتجات الأخرى، فلهذا أصبح غير قانوني في معظم البلدان منذ عام 1986 بعد أن أدرجته منظمة الصحة العالمية كأحد الممنوعات وأكثر المؤثرات على العقل، ويختلف تأثير الجرعة من شخص إلى آخر حسب تاريخ الاستخدام وتكرار الاستخدام فمع

تم عزل الدنا المجيني من أفراد عينتي التعاطي الا (80) إضافة الى (20) فرداً كعينة مقارنة وفق طريقة طبقت لأول مرة بدمج طريقتين من طرق استخلاص الدنا المجيني من الدم هما طريقي [13] و[14] لغرض الحصول على كمية اكبر من الدنا واختزال الوقت من 24 ساعة الى 4 ساعات فقط.

#### تقدير تركيز ونقاوة الدنا المستخلص:

تم تقدير تركيز الـ DNA بقياس الامتصاصية لطيف الأشعة فوق البنفسجية باستخدام جهاز قياس الكثافة الضوئية Spectrophotometer وعند الطول الموجي (260) نانوميتر إذ تم تخفيف العينات المراد تقدير تركيز الدنا فيها إلى 100 مرة باستخدام الماء المقطر وذلك بأخذ 20 مل عينة وإضافتها إلى 1980 مل ماء مقطر وطبقت المعادلة الآتية:

تركيز الـ DNA مايكروغرام / مايكروليتر = قراءة الامتصاصية لكل مل من العينة × معكوس التخفيف (100) × 1000/50  
قدرت نقاوة الدنا المستخلص من حاصل قسمة قراءة الامتصاصية عند الطول الموجي (260) على قراءة الامتصاصية عند الطول الموجي (280) نانوميتر [15].

#### تقدير الأوزان الجزيئية

قدرت الأوزان الجزيئية للـ DNA المستخلص اعتماداً على المسافة التي قطعوا في الهلام بالمقارنة مع الدليل الحجمي للحمض النووي معروف الوزن الجزيئي (Genomic marker 1Kbp) والأوزان الجزيئية للقطع الناتج من تقنية PCR قدرت بالمقارنة مع دليل حجمي خاص بناتج PCR (DNA Ladder 100bp) إذ أعطى هذا الدليل في هلام الاكاروز إحدى عشر حزمة ذات أوزان جزيئية معروفة [15].

تفاعلات الـ RAPD Random Amplified polymorphic DNA :

تم إجراء تفاعلات الـ RAPD بالاستناد إلى [16] على عينات DNA المستخلصة من الأفراد قيد الدراسة وباستخدام البادئات العشوائية التالية.

رمز البادئ	تابع البادئ 3 . 5
OPA-01	CAGGCCCTTC
OPA-11	CAATGCCGT
OPV-19	GGGTGTGCAG
OPD-20	ACCCGGTCAC

#### النتائج والمناقشة

5- قياس فعالية إنزيم الفوسفاتيز القاعدية (ALP) Measurement of Alkaline phosphatase Activity استخدمت طريقة Kind & King في قياس فعالية الإنزيم [8].

6- قدير كمية الإنزيمات الناقلة للأمينات البيروفية والأوكزيلية (SGPT&SGOT) استخدمت طريقة (Kind & King) في قياس فعالية الإنزيم [8].

7- قدير كرياتينين الدم blood Creatinine Measurement of تم قياس تركيز الكرياتينين باعتماد طريقة (Jaffe) [9]

8- قدير يوريا الدم blood Urea Measurement of تم قياس تركيز يوريا الدم (Jaffe) لقياس تركيز يوريا الدم [9].

#### - الدراسة الوراثية الخلوية Cytogenetic Study

##### 1- الفحوصات الخلوية الوراثية

استعملت الطريقة المتبعة لزراعة وحصاد الخلايا المفاوية-G banding (banding) والهضم بإنزيم التريسين Trypsine والمنكورة من قبل [10] والتي اجري لها بعض التحويلات من قبل المركز العراقي لبحوث السرطان و الوراثة الطبية [11]. تم زراعة 80 عينة دم مسحوبة من الأشخاص المصابين وبعد الحصاد فحصت الشرائح الزجاجية جيداً بواسطة مجهر ضوئي مركب مزود بشاشة عرض باستعمال العدسة الشبيهة (10X) تم إجراء خاصة مسح شامل على الشريحة للبحث عن الخلايا المنقسمة، فحصت الخلايا المنقسمة باستخدام العدسة الزيتية (100X) ثم صورت الخلايا المنقسمة لعرض معرفة العدد الكلي Chromosomal للクロموسومات، وتم حساب التغيرات الكروموسومية Karyotype في الخلايا المنقسمة في الطور الاستوائي بواسطة Aberration العدسة الزيتية (100X) تم تحديد الاضطرابات الكروموسومية بالتقاط صور بواسطة كاميرا رقمية للأطوار الاستوائية لكل حالة وتحويلها إلى وضعية طبعة النواة smart باستخدام نظام اليكتروني (Karyotype) يقوم بفحص كل كروموسوم بشكل تفصيلي وحساب كل التغيرات الطور الاستوائي ومقارنتها على الشبكة العنكبوتية بقاعدة المعلومات معدة أصلاً لعرض تحديد الاضطرابات الوراثية.

##### 2- تحضير الأنوية الصغيرة Preparation of Micronuclei

تم إتباع الخطوات الواردة في الفقرة السابقة نفسها مع مراعاة بعض التعديلات باستخدام مادة (Cyto- b) وبعض الدوائي الأخرى [12].

3- معامل الانقسام MI)Mitotic Index استخدمت طريقة [10](Shubber & Allak , 1989) عزل الدنا المجيني :Genomic DNA Isolation

## مدة التعاطي:

تترواح الجرع التي يعتاد على تناولها المدمنين من متوسطة (3-1) حبة 10 ملغم / يوم الى عالية (5-3) حبة 10 ملغم/ يوم، وفي الجرعات العادية (1) حبة 10 ملغم / يوم جدول (1)، وينتج عن الكابتن تكون ارتفاعا في ضربات القلب ودرجة الحرارة سرعة التنفس وكذلك ارتفاعا في ضغط الدم. يحس المستخدم في بداية الأمر بالنشاط المفرط والفعالية وقوة التركيز ولكن في نهاية الأمر ومع الاستخدام المستمر تبدأ المشاكل بالظهور تدريجيا. من هذه المشاكل: التعب العام والإنهاك، الاكتئاب، القلق، اضطرابات النوم والقدرة الجنسية بالإضافة للذهان(الجنون) وبباقي المشاكل التي تصاحب استخدام الأمفيتامينات.

جدول (1) الجرعة المتناولة وأعداد الأفراد في عينات الدراسة

الجرعة	العدد	العينات	ت
عالية			
14	35	49	تعاطي(3-2)(سنة 1)
20	11	31	تعاطي(5-3)(سنة 2)
-	-	20	السيطرة
			3

## دراسة المتغيرات الفسلجية

### 1 - تركيز الهيموغلوبين Hemoglobin concentration

تشير نتائج الدراسة الى وجود انخفاضا معنويا ( $P \leq 0.05$ ) في تركيز الهيموغلوبين لدى الأشخاص المتعاطين عند مقارنته بمجموعة السيطرة، حيث كان متوسط التركيز لدى مجموعتي المتعاطين (9.0) و(9.4) g% ومجموعة السيطرة (15.6) g% جدول (2). ان جسم الإنسان مبرمج ليعرض أي نقص في كريات الدم او كمية الهيموغلوبين خلال فترة 45 يوما إلا إذا كان هناك معوقا يؤخر عملية التعويض تلك كحدث اضطراب في تركيز العديد من العناصر التي لها دور فعال في أيض الحديد وامتصاصه من خلال السيطرة على عملية أكسدته ومن ثم ارتباطه مع ناقل (Transferrins) لنقله إلى أنسجة الجسم التي يحدث فيها تخليق الهيموغلوبين، إذ ان بعضها علاقة في تركيز الهيموغلوبين مما يؤدي الى انخفاض امتصاص الحديد في الجسم وهذا ما أكدته دراسة [4] وقد يعود السبب في هذا الانخفاض الى العزوف عن تناول الطعام والمأكولات الغذائية المهمة وبالتالي انخفاض مستويات كثيرة من المواد الفسلجية المهمة في ايض الهيموغلوبين، إذ أشارت بعض الدراسات الى ان الخل في فعالية السيرولوبلازمين وهو بروتين ناقل يؤدي الى حدوث خلل في امتصاص الحديد وبالتالي يؤثر في تركيز هيموغلوبين الدم في الجسم [2] هذا من جانب ومن جانب اخر فقد

جدول (2) الفحوصات الدموية لعينات الدراسة

السيطرة	المتعاطين		الفحص
	تعاطي (5-3) سنة	تعاطي (3-2) سنة	
15.6	9.0	9.4	تركيز الهيموغلوبين Hb g%
6900	4100	4600	تعداد كريات الدم البيض WBC خلية / ملم <sup>3</sup>
10	51	45	معدل ترسيب كريات الدم

### - بليروبين المصل الكلى Total serum bilirubin

تشير الدراسة الحالية الى وجود ارتفاعاً معنوياً ( $P \leq 0.05$ ) في مستوى البليروبين لدى مجموعة المتعاطين مقارنة مع مجموعة السيطرة وكانت

بمجموعة السيطرة، حيث وجد ارتفاعاً معنوياً ( $P \leq 0.05$ ) في فعالية انزيم (GOT) لدى مجموعة المصابين (32) و (34) U/L عند مقارنتها بمجموعة السيطرة (12) U/L جدول (3) وهذا ما يؤكد علاقة التعاطي وما نتج عنه من تراكم للمركبات الكيميائية في الكبد وهذه النتيجة مطابقة لدراسة [19] التي أكدت وجود ارتفاع في مستوى فعالية إنزيم (GOT) لدى المجاميع المعرضة للمركبات الكيميائية عند مقارنتهم بمجموعة السيطرة.

كما أظهرت الدراسة ان فعالية انزيم (GPT) لدى المصابين مرتفعة معنوياً ( $P \leq 0.05$ ) (36) و (38) U/L عند مقارنتها مع مجموعة السيطرة (18) U/L جدول (3) وان هذه الزيادة قد تعود الى ارتفاع مستوى المركبات الكيميائية واكسيدتها الأخرى في الكبد والذي يؤدي الى تلف خلايا الكبد وبالتالي زيادة فعالية الأنزيم في مصل الدم. وتعد هذه النتيجة مطابقة لما جاء في دراسة [21] حيث لاحظ ارتفاعاً في مستوى انزيم (GPT) لدى العديد من المرضى الذين يتعاطون الأدوية المسكنة للألام.

جدول (3) فحوصات وظائف الكبد لعينات الدراسة

السيطرة	المتعاطين		الفحص	ن
	تعاطي (5-3) سنة	تعاطي (3-2) سنة		
0.6	3.8	3.2	بليروبين المصل mg/dl TSB	1
9.2	28	24	إنزيم الفوسفاتيز القاعدي K.A.U/dl ALP	2
12	34	32	الأنزيمات الناقلة للمجموعة الأمين U/L GOT	3
18	38	36	الأنزيمات الناقلة للمجموعة الأمين U/L GPT	4

### 5- وظائف الكلية(الجهاز البولي)

#### - اليوريا Urea

تشير الدراسة جدول (4) الى ارتفاع معنوياً ( $P \leq 0.05$ ) في معدل يوريا مصل الدم لمجموعة المتعاطين (42) و (47) mg/dl في عينة السيطرة، وان هذا الارتفاع قد يكون مقارنة بـ (33) mg/dl.

### 4- وظائف الكبد Liver function

(3.2) و (3.8) mg/dl لدى المصابين و (0.6) mg/dl لدى مجموعة السيطرة، وهذه النتيجة تتناسب مع الانخفاض في تركيز الهيموغلوبين وتثبت العلاقة العكسيّة بينهما جدول (3). ان ارتفاع تركيز البليروبين لدى المصابين ربما يعود الى تضرر الكبد او الى خلل في مسار البليروبين او انحلال كريات الدم الحمراء بسبب تأثيرها بالمواد الكيميائية التي قد تلتصق بجداران الكريات الدموية مسببة تجلطها او تكسرها، اذ تبين وجود ارتفاع ملحوظ في مستوى البليروبين الكلي لدى مجموعة المتعاطين بارتفاع درجة التعاطي والذي قد يعود ايضاً الى ارتفاع المؤشرات الحيوية الأخرى مثل ضغط الدم ودرجة الحرارة، اذ تشير دراسة [20] والتي أجرتها على مرضى ارتفاع ضغط الدم الى ارتفاع نسبة تعرضهم للجلطات مقارنة بأصحاب الضغط الاعتيادي بأربع أضعاف.

### - إنزيم الفوسفاتيز القاعدي Alkaline phosphatase enzyme

أثبتت نتائج الدراسة ارتفاعاً معنوياً ( $P \leq 0.05$ ) في فعالية إنزيم الفوسفاتيز القاعدي لدى المصابين (24) و (28) K.A.U/dl عند مقارنته مع مجموعة السيطرة (9.2) K.A.U/dl جدول (3)، وهذا الارتفاع قد يعود الى تأثير فعالية الأنزيم بالاكاسيد التي تطلقها المواد الكيميائية الداخلة في تركيب تلك الحبوب خصوصاً إذا ما علمنا بأنه طرأ تغير على طريقة تصنيع الكابتاكون بإضافة مواد أخرى له لإنتاج كابتاكون أرخص يسمى الكابتاكون المزيف (Counterfeit Captagon) لل캡تكون المزيف: كافيين، أمفيتامين، كويين، ثيوفينلين، إفیدرين ومواد أخرى غيرها وذلك يسبب تلفاً لخلايا الكبد [4, 2, 3, 4]، وقد أشار [21] الى وجود ارتفاع في إنزيم (ALP) لدى مجموعة من المرضى الذين يتعاطون الأدوية المهدئة بشكل مفرط.


### - الأنزيمات الناقلة لمجموعة الأمين Amino (GOT&GPT) transferase enzymes

أظهرت نتائج الدراسة ارتفاعاً معنوياً ( $P \leq 0.05$ ) في فعالية إنزيمي (GOT&GPT) لدى مجموعة المتعاطين عند مقارنتهما

(2) عدم حصول تغيرات كروموسومية تركيبية او عدديه لعينة المتعاطين او عينة السيطرة، بينما تشير الدراسة الى تكون النوى الصغيرة (Micronuclei) وبأشكال متنوعة في (9%) و (13%) من المتعاطين وكذلك ارتفاع معامل الانقسام Mitotic Index (الذى يعتبر دالة عكسية لزمن الجيل بالنسبة للخلية فيووضح أي تغير في الزمن المحدد لانقسام الخلية نتيجة لعرضها للعوامل الكيميائية والفيزيائية) في جميع الحالات حيث بلغ في عينة المتعاطين (3.0%) مقارنة مع عينة المقارنة (1.3%) يحتمل إن يكون مؤشر لحدوث حالات مرضية أو تشوّهات أو اضطرابات على المستوى الكرومosomal إذ يشير ارتفاع نسبة معامل الانقسام لدى عينة الدراسة مقارنة بعينة السيطرة إلى أن الكاباكتون ذو تأثير محفز للخلايا المفاوئية على الانقسام وذلك من خلال تحفيزها على النمو وزيادة معامل التحول الأورمي ومن ثم زيادة معامل الانقسام [21,15].



صورة (1) الطور الكرومومسي الاستوائي لأحد أفراد عينة الدراسة



صورة(2) الأنوية الصغيرة لأحد أفراد عينة الدراسة

ان المواد الكيميائية تؤدي إلى تثبيط تصنيع DNA وإظهار التشوّهات الوراثية إذ أنها قد تؤثر في إنzymes that produce DNA و إصلاح DNA

سببه حصول ضرر في النسيبات الجامعية بسبب ما تعانيه الكلية من ترسب المواد الكيميائية التي تطلقها تلك الأدوية مما يؤدي بالنتيجة الى انخفاض كفاءة الكلية في الترشيح لاليوريا الدم [17] وهو ما أشار إليه [22] في دراسته لتأثير استخدام عقار الكورتيزون على نفاذية او تناسخ أنسجة الكلية والذي يؤدي الى انخفاض كفاءة الكلية في الترشيح لحمض البوليك مما يسبب ارتفاعا في نسبة تواجده في الدم.

#### - الكرياتينين Creatinine

أوضحت الدراسة حدوث ارتفاع معنوي ( $P \leq 0.05$ ) في مستوى كرياتينين مصل دم مجموعة المصابين (1.4) و (1.8) مقارنة بـ (0.8) mg/dl في مصل دم عينة السيطرة جدول (4)، ان هذا الارتفاع قد يفسر على اساس ان ارتفاع يوريما الدم تسبب تلفا في انسجة الجسم بأعتبارها سوموم اولية مما يسبب زيادة في طرح الكرياتينين في الكلية مما يؤثر على عمل الكلية وكفاءتها في طرح الكرياتينين وهذا يرفع نسبة في مصل الدم، إذ أشار [19] الى ان ارتفاع نسبة اليوريما في الدم تسبب ارتفاعا ملحوظا في كرياتينين مصل الدم بسبب الأضرار الميكانيكية والكيميائية التي تسببها اليوريما في انسجة الجسم كالدماغ والكبد.

جدول(4)فحوصات وظائف الكلى لعينات الدراسة

السيطرة	المتعاطين		الفحص	ت
	تعاطي (5-3) سنة	تعاطي (3-2) سنة		
33	47	42	اليوريما mg/dl	1
0.8	1.8	1.4	كرياتينين Creatinine mg/dl	2

#### الدراسة الوراثية - الخلوية

تعتمد التأثيرات الصحية الوراثية للعقاقير الطبية على فترة التعاطي ونوع العقار وتركيزه، إذ تدخل هذه المواد الكيميائية إلى الدورة الدموية بطرق مختلفة مسببة خللاً في الدورة الأيضية [17, 5]، يستعمل فحص التغيرات الكرومومسية للكشف عن تأثير الكثير من المواد الكيميائية في جسم الكائن الحي والتي تكون مختلفة وذات تأثير متبادر في التركيب الوراثي فقد يحدث تكرار عالي للتغيرات الكرومومسية لذا استخدم هذا الاختبار لمعرفة مدى تأثير تعاطي عقار الفنيثيلين على عينة من المدمنين عليه وتبين من خلال الفحص لـ (30) خلية منقسمة في الطور الاستوائي لكل فرد من أفراد عينة التعاطي (جدول 4) صورة

Mg+2، ودقة الماصة المستخدمة في إجراء التجارب ، ونوعية إنزيم البلمرة وتركيزه[26]. استخدمت مؤشرات RAPD في هذه الدراسة لتحديد الضرر الوراثي الحاصل في عينة الدراسة بالمقارنة مع العينة الضابطة (المقارنة) بالاعتماد على ظهور حزم التضاعف أو عدم ظهورها وكذلك الاختلاف في الأوزان الجزيئية لتلك الحزم التي تختلف باختلاف عدد المواقع المكملة لنتائج البادئ على شريط الدنا الجيني وكذلك تختلف باختلاف المسافة بين موقع آخر [27].

#### البادئ OPQ-01:

تم الحصول على حزمة عامة واحدة Main band الصورة (3) وكانت ذات وزن جزيئي (3100) bp، اذ ان البادئ أعلاه لم يظهر أي تغيير وراثي إذ تدل هذه الحزمة العامة على وجود قطعة من الدنا مشتركة بين العينات.

#### البادئ OPA-11:

اظهر هذا البادئ (4) موضع جديدة لم تلاحظ في عينة المقارنة وكانت أوزانها الجزيئية (2500, 900, 700, 490) bp في حين أظهرت عينة المقارنة حزمة واحد بوزن جزيئي (490) bp كما في الصورة (4).

#### البادئ OPV-19:

تمثلت نواتج هذا البادئ في(4) موضع ارتباط تباينت فيها الأنواع في العدد والموقع وتراوحت أوزانها الجزيئية (4000-600) bp، وتم الحصول على حزمة عامة Main bands نتيجة لتفاعل PCR لهذا البادئ مع الدنا الجيني لجميع الأنواع قيد الدراسة بوزن (1100) bp كما في الصورة (5).

#### البادئ OPD-20:

اظهر هذا البادئ أربعة مواقع مختلفة للأوزان الجزيئية، إذ ظهرت هذه الحزم عند المستوى نفسه لدى. وكانت على التوالي (6). 1700,1400,1000,650 bp الصورة (6).

ان ظهور موقع جديد للارتباط في عينة الدراسة للأشخاص المتعاطين للحبوب المسهرة قد يعود الى حدوث طفرات على المستوى الجيني في المحتوى الوراثي العائد لهؤلاء الأشخاص، وتبين الدراسة جدول (4) صور (3-6) ازدياد معدل ظهور هذه المواقع بازدياد الجرعة وفتررة التعاطي حيث لوحظ ترد الظهور لدى عينة الدراسة (3-4) سنة

أكثر من تأثيرها في جزيئات DNA بصورة مباشرة، إضافة إلى إنتاج الأوكسجين النشط الذي يسبب استنزاف مضادات الأكسدة الدافعية ومن ثم يؤدي إلى تلف DNA[23]. ويسبب التعرض المستمر لبعض المركبات الكيميائية السامة إلى إحداث تسمم جيني Embryo toxins فهي تؤثر على الجنين في مراحل التكون الأخيرة وتسبب له الموت أو تشوه Malformation وتأخر النمو ومشاكل وظيفية. اما المواد المسبيبة للتشوه الخلقي فهي تؤثر في التركيب الجيني للخلايا الجنسية للأبؤين نتيجة التعرض للمطرفات، وتظهر في الأجيال اللاحقة[24]. فسر [25] ارتفاع نسبة معامل الانقسام إلى حدوث تغيرات في غشاء الخلية، نتيجة لتأثير المطرفات والمسرطنات وتفاعلها مع المكونات الكيميائية الداخلة في تركيب غشاء الخلية. حدوث حالة ضعف مستمر في السيطرة على فعالية الجينات في الاستنساخ المستمر وتخلق البروتينات، بسبب تفاعل المواد الكيميائية مع جزيئات المادة الكابحة Resspressor Molecules والمسئولة عن عملية السيطرة على فعاليات الجينات الوراثية.


جدول(5) فحوصات الوراثة الخلوية لعينات الدراسة

السيطرة	المعاطين		الفحص	ت
	تعاطي (5-3) سنة	تعاطي (3-2) سنة		
0	0	0	النمط الكروموسومي Chromosomal Karyotype	1
0	13	9	النوى الصغيرة Micronuclei	2
1.3	2.7	3.0	معامل الانقسام % Mitotic Index	3
%0	%7	%3	الاضطرابات الجزيئية والحزم الجديدة	4

الدراسة الوراثية - الجزيئية

نتائج تفاعلات البادئ RAPD:

تصف مؤشرات RAPD بحساسيتها لأي تغيير في مكونات تفاعلاتها لهذا تعد من التفاعلات التي يصعب إعادةتها والحصول على النتيجة نفسها، فنتائجها تتغير بتغير تراكيز مكونات التفاعل والظروف المحيطة به ولغرض الحصول على نتائج جيدة يجب إجراء عدة تجارب لغرض الوصول إلى الظروف المثلى للتفاعل ، وهناك عدة عوامل يمكن من خلال السيطرة عليها إعادة التفاعل والحصول على النتائج نفسها ومنها تركيز الدنا الجيني، وملازمة البرنامج المنفذ على جهاز الميلمر Thermocycler ، وتركيز البادئ المستخدم، وتركيز ايونات



صورة (6) الترحيل الكهربائي للحمض النووي لأحد أفراد عينة الدراسة باستخدام البادي OPD-20

#### المصادر

1- الإدمان أسبابه ومظاهره والوقاية والعلاج. الكتاب الخامس من سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الجريمة. وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية. 1406 هـ (1986م).

2- جامع، حامد(2009) المخدرات أنواعها ومادتها وحكمها، وزارة الداخلية الكويتية، الطبعة الثانية، ص 15 ، 21.

3- Baer DM. Paulson RA. Williams RH.(2007) Cut-off and toxicity levels for drugs-of – abuse testing. Clin. Lab.pp12-13

4- World Drug Report(2009) Trends in drug use among young people ,United


Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Publication Sales No. E.09.XI.12 , pp 23-56

5- Pamela C. Richard A. pharmacology(2005) 2nd ed. British med. Assoc. Royal Pha. Soc. G. Britain


6. World Health Organization(2001) Manual of basic techniques for a laboratory, 1st.Ed., Geneva.

7. Martin H.(2006) Basic Methods for the Biochemical Lab,1st.Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.


تعاطي بنسبة 3% وفي عينة الدراسة (3-6) سنة تعاطي بنسبة 7% مما يدل على حدوث ضرر وراثي في حين لم تظهر عينة المقارنة أي ترددات جديدة.



صورة (3) الترحيل الكهربائي للحمض النووي لأحد أفراد عينة الدراسة باستخدام البادي OPQ-01



صورة (4) الترحيل الكهربائي للحمض النووي لأحد أفراد عينة الدراسة باستخدام البادي OPA-11



صورة (5) الترحيل الكهربائي للحمض النووي لأحد أفراد عينة الدراسة باستخدام البادي OPV-19

- 18- شيبتون، باركر. الأفريقيه والمجتمعات، والأمن الغذائي:  
أنتروبولوجيا وجهات نظر(2007) الاستعراض السنوي  
للانثروبولوجيا،19: 353-394.
- 19- Di Marzo V, Cote M, Matias I, Lemieux I, Arsenault BJ, Cartier A, Piscitelli F, Petrosino S, Almeras N, Despres JP(2009)Changes in plasma endocannabinoid levels in addict men following a 1 year lifestyle modification programme associations with changes in metabolic risk factors. Diabetologia, 52:213-217.
- 20-Vinyoles E. Vera M. Cecilia F. Blood Pressure Measurement , the Waiting Time Between Readings (2006): Pp.14.18
- 21- الراوي، عبد المجيد عبد العزيز، سمير مشرف خلف، دراسة وراثية - خلوية على المدمنين على تعاطي الأدوية المسكنة (2007)، مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفية، المجلد الأول، العدد الأول.
- 22-KENNEDY, M. THURSBY.P Cortisone in tretment of children wilfi chronic asthema(2001) Med. Res. Cou. Staff; Clinical Assistant In Respiratory Physiology, Stoke-on-Trent Consultant Paediatrician, North Staffordshire Royal
- 23- الغانمي، ياسمين خضير خلف. (2006). دراسة التغيرات المناعية والوراثية في الأشخاص المعرضين للنفط ومشتقاته. أطروحة ماجستير، كلية التربية، جامعة كربلاء.
- 24- عجام ، رجاء مهدي وشاكر ، محمد عبد الوهاب (1999). التأثير السمي الوراثي للفينول والتلوين في الخلايا المفاوية للإنسان (خارج الجسم). مجلة أبحاث الثقافة الحيوية ، المجلد الأول ، العدد / 1 ، ص 28-35.
- 25- الأعظمي،محمد عبد الوهاب (2000).دراسة التغيرات الكروموسومية في الإنسان الناتجة من التلوث بالنواتج العرضية للصناعات النفطية. رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة بغداد.

8. Tracey Hopkins, BSN, RN(2005) LAB Notes guide to lab. diagnosis test ,F. A. Davis Co., Philadelphia.
9. World Health Organization(2003) Manual of basic techniques for a laboratory, 2nd ed., Geneva.
10. Hon Fong L (2000) medical Cytogenetics Madison Avenue, New York.,
- 11- Yaseen, N.Y. ; Hummadi, A.M.A.; Tawfik, M.S. and Rasheed, S.R. (1999). Modified technique in Cytogenetic prararation of leukaemia. J. Nah. Univ. Sience. 3: 175-180.
- 12-Schmid,W.(1975) The micronucleus test. Mut. Res. 31:9-15.
- 13-Joshi, N., R.A. Rawat, B. Subramanian and K.S. Rao(2010) A method for all genomic DNA isolation suitable for molecular marker analysis. Indian J. Sci. Technol., 3: 1214-1217.
- 14-Bautista, R., F.M. Canovas and M.G. Claros(2003) Genomic evidence for a repetitive nature of the RAPD polymorphism in human. Euphytica, 130: 185-190.
- 15-Maniatis ,T.,Fritsch,E.F. and Sambrook.(2001).In vitro applications of DNA by the polymerase chain reaction , in molecular cloning: A laboratory manual.2nd ed., Cold Spring Harbor lab.
- 16-Ramanathan, T., T Dhinesh, S Gurudeeban and K Satyavani(2011) In vitro screening of salt marsh plants for hemolytic activity in human blood. Inventive Rapid: Ethno Pharmacol., Vol. 2. No. 2.
- 17-Rahman K. (2009) Biochemical Parameters in the Serum of Neurological Patients in Bangladesh. Int J Biomed Sci. 5(4):395–401.

K.A(2010) An efficient method for DNA extraction from Cladosporioid fungi. Genet. Mol. Res. 9, 2283–2291.

26-Zhao, W. and Y. Pan(2004)Genetic diversity of by DNA markers. Int. J. Agric. Biol., 6: 950-956. 27-Moslem, M.A.; Bahkali, A.H.; Abd-Elsalam,

## PHYSIOLOGICAL ,CYTOGENETIC AND MOLECULAR STUDY OF SAMPLE OF CAPTAGON ADDICTS IN AL-RAMADI PROVENANCE.

SAMIR MISHRIF KHALAF AL-DOLYME

### ABSTRACT.

The study was carried out on (80) individuals of insomnia tablets (Captagon), The ages of the individuals was between (20-40) years and the period of tablet taking was between (2-5)years. The study sample was divided into two group (40)drivers and(40)night guards, and (20) person as control sample , The study aimed to study some side effects of the drugs which accompany this case of addiction. The study also aimed to identify the physiological changes which could happen to the addicts of such drugs and study the cytogenetic and molecular measurements of the addicts. It has been found that the use of Captagon causes many side effects like (fatigue and anxiety) and a significant decrease  $P<0.05$  in the concentration of the Hb%(9.4 and 9.0)% accompanied by a decrease of the average of the total W.B.Cs Count (4600 and 4100)cell/ml<sup>3</sup>, associated with decrease of immunity of the addicts greatly. There is a significant increase of the average of the E.S.R.  $P<0.05$  (45 and 51)ml/hor. and there was also an increase of the biomarkers of the liver function tests TSB (3.2 and 3.8)mg/dl , ALP(24 and 28)K.A.U./dl ,GOT(32 and 34)U/L and GPT (36 and 38)U/L. On the other hand there were a significant increase of the average of the biomarkers of Kidney function tests blood urea (42 and 47)mg/dl and serum creatinine (1.4 and 1.8) mg/dl.

Although there were no chromosomal aberrations or disorders, there were formations of micronuclei of the individuals of sample(9 and 13)% and this may refer to micro deletions breaks which could not be observed easily through this test. Also there was an increase in the mitotic index (MI) with (3.0 and 2.7) and molecular aberrations were forming new bands in the RAPD-PCR test (3 and 7)% of the individual of the sample.